

FICHA TECNICA

FOLIMASTER ULTRA

NOMBRE : FOLIMASTER ULTRA

TIPO DE PRODUCTO: Bioestimulante de
aplicación foliar

DESCRIPCION DEL PRODUCTO :

FOLIMASTER ULTRA ,es una formulación innovadora a base de derivados del aminoácido L-cisteína, diseñada para estimular los procesos metabólicos de la planta. Su acción favorece la recuperación vegetal frente a situaciones de estrés y mejora el rendimiento fisiológico general del cultivo.

COMPOSICION :

Composición	%P/V
AATC (ácido N-Acetyl-thiazolidin-4-carboxilico)	2.5%
ATC (ácido thiazolidin-4-carboxilico)	2.5%
Ácidos carboxílicos	250 ppm
Vitaminas	100 ppm
Adyuvantes e inertes	100%

MODO ACCION:

FOLIMASTER ULTRA , actúa a nivel celular activando el metabolismo general de la planta, incrementando la síntesis de proteínas, la actividad enzimática y la división celular. Su base en derivados de L-cisteína permite una rápida absorción foliar, optimizando la respuesta fisiológica de la planta frente a factores de estrés como trasplante, plagas, enfermedades, frío, calor, salinidad o fitotoxicidad por agroquímicos.

Además, favorece la **recuperación del crecimiento**, mejora la eficiencia fotosintética y **estimula la producción de biomasa vegetal**.

CULTIVOS RECOMENDADOS



Hortalizas, frutales, cereales, leguminosas, ornamentales, y Tubérculos.

CULTIVOS	MOMENTOS DE APLICACION	DOSIS		
		Mochila	Cilindro	ha
Cereales: arroz, avena, maíz, quinua, trigo, sorgo.	1. Al estadio de 3-6 hojas. 2. Al inicio de la panícula.	8-10 mL	80-100 mL	200 mL
Flores y ornamentales: Alstroemeria, clavel, crisantemos, gerbera, gipsophylla, gladiolos, pompos, rosas y otras flores y ornamentales.	1. Aplicar a los tres días después del trasplante o al inicio del desarrollo vegetativo. 2. Aplicar cada 15 días para mejorar crecimiento y formación de flores.	8-10 mL	80-100 mL	200 mL
Hortalizas: Ajo, alcachofa, apio, berenjena, betarraga, brócoli, cebolla, col, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, pepino, poro, rábano, rocoto, tomate, zapallo. Ají, páprika, pimiento, piquillo y demás ajíes.	De 3 a 5 aplicaciones: 1. Aplicar una semana después del trasplante. 2. En pleno crecimiento del cultivo. 3. Antes de floración. 4. y 5. Aplicación durante el llenado de frutos hasta la cosecha.	8-10 mL	80-100 mL	200 mL
Leguminosas: Arveja, frijol, garbanzo, habas, holantao, pallar, vainita.	De 3 a 5 aplicaciones cada 20 días a partir de que la planta tenga 4 a 6 hojas.	8-10 mL	80-100 mL	200 mL
Tubérculos y raíces: Camote, oca, olluco, papa, yuca y otros.	3 aplicaciones: 1. Cuando las plantas tengan 5 - 6 hojas. 2. Al inicio de la floración. 3. En plena floración	8-10 mL	80-100 mL	200 mL
Frutales siempre verdes: Arándano, cacao, café, chirimoya, dátil, fresa, granadilla, guanábana, limón, lúcuma, mandarina, mango, maracuyá, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce,	De 3 a 5 aplicaciones. 1. Aplicar una semana después del transplante 2. En pleno crecimiento del cultivo. 3. Antes de la floración. 4. y 5. Aplicación durante el llenado de frutos hasta la cosecha.	1 % o 1 mL por litro de agua utilizada		

plátano, tara, tangelo, toronja, tuna y demás frutales.		
Frutales caducifolios: Cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, pecano, perla, vid y demás frutales.	De 3 a 5 aplicaciones. 1. Aplicar una semana después del trasplante. 2. En pleno crecimiento del cultivo. 3. Antes de la floración. 4. y 5. Aplicación durante el llenado de frutos hasta la cosecha.	1 % o 1 mL por litro de agua utilizada

EFFECTOS ESPERADOS

Estimula el metabolismo general de la planta, favoreciendo la síntesis de proteínas y la actividad enzimática.

Promueve una rápida recuperación frente al estrés (trasplante, heladas, salinidad, fitotoxicidad, etc.).

Mejora la absorción y aprovechamiento de nutrientes.

Incrementa el desarrollo radicular y vegetativo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares.

Evitar mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

TOXICIDAD

Nivel de toxicidad: No tóxico

APLICARLO de acuerdo a las instrucciones de uso.

Medio ambiente: Producto biodegradable, de bajo riesgo ambiental, pero se

recomienda evitar aplicaciones directas en fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

El líquido es soluble en agua para preparar la mezcla, agitar fuerte el envase antes de abrirlo, medir la cantidad ideal recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar al volumen o concentración deseada.

Se aplica empleando mochila manual, de motor, con motobomba y con avión. El equipo de aplicación debe estar en perfectas condiciones. Use boquillas de cono para las aplicaciones.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua limpia.

PRESENTACION

Caja x 12 Lt

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR :



CORPORACION INTERNACIONAL BREMAX S.A.C.