

FICHA TECNICA

MAXIFLOR + CITOQUININAS

NOMBRE : MAXIFLOR CITOQUININAS

TIPO DE PRODUCTO: Fertilizante Foliar

DESCRIPCION DEL PRODUCTO :

MAXIFLOR CITOQUININAS, es un fertilizante soluble de acción bioestimulante que **favorece la inducción floral, el cuajado uniforme y el desarrollo óptimo del fruto.**

Su formulación combina nutrientes clave (Ca, B, Zn, Mg) con citoquininas naturales, hormonas vegetales que regulan la división y diferenciación celular, promoviendo una floración abundante, un mejor amarre de frutos y mayor rendimiento por planta.

Es la herramienta ideal para maximizar el potencial reproductivo y productivo de los cultivos frutales y hortícolas.

CULTIVOS RECOMENDADOS



Hortalizas, frutales, cereales, leguminosas, ornamentales, y Tubérculos.

COMPOSICION :

Composición	%P/V
Carboxilato de Calcio (CaO)	14.00%
Boro (B) EDTA	2.00%
Zinc (Zn)	3.00%
Magnesio (MgO)	4.00%
Citoquininas naturales	1200 ppm
Ácidos carboxílicos	2000 ppm
Bio activadores enzimáticos	6000 ppm

MODO ACCION:

MAXIFLOR CITOQUININAS

- ❖ **Calcio (Ca):** fortalece paredes celulares, mejora firmeza y vida postcosecha.
- ❖ **Boro (B):** clave en la polinización, germinación de polen y cuajado de frutos.
- ❖ **Zinc (Zn):** estimula la síntesis de auxinas, mejorando la diferenciación floral.
- ❖ **Magnesio (Mg):** esencial para la clorofila y energía fotosintética.
- ❖ **Citoquininas:** regulan la división celular y retrasan la senescencia, favoreciendo una **floración uniforme y prolongada.**

MOMENTO DE APLICACIÓN: Durante etapas de crecimiento vegetativo, floración, cuajado y estrés climático.

CULTIVO	Dosis foliar	MOMENTO DE APLICACION
Frutales (uvas, cítricos, palto, mango, arándanos, etc.)	1 – 1.5 L/ha en 200 L agua	Prefloración – Floración – Post cuajado
Hortalizas (tomate, pimiento, melón, sandía, etc.)	0.5 – 1 L/200 L agua	Inicio de floración – Cuajado de fruto
Café y Cacao	1 L/ha cada 20 días	Floración – Amarre – Desarrollo de fruto
Cereales y Granos	1 – 1.2 L/ha	Floración – Llenado de grano

EFFECTOS ESPERADOS

- ❖ Corrección rápida de clorosis y deficiencias de Zn, Fe y Mn.
- ❖ Incremento en la síntesis de clorofila y mayor reverdecimiento.
- ❖ Mejora en la fotosíntesis y eficiencia metabólica de la planta.
- ❖ Mayor desarrollo radicular y uniformidad de crecimiento.
- ❖ Plantas más resistentes y productivas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares.

Evitar mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

TOXICIDAD

Nivel de toxicidad: No toxico

APLICARLO de acuerdo a las instrucciones de uso.

Medio ambiente: Producto biodegradable, de bajo riesgo ambiental, pero se recomienda evitar aplicaciones directas en fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

El liquido es soluble en agua para preparar la mezcla , agitar fuerte el envase antes de abrirlo , medir la cantidad ideal recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar al volumen o concentración deseada .

Se aplica empleando mochila manual, de motor, con motobomba y con avión. El equipo de aplicación debe estar en perfectas condiciones. Use boquillas de cono para las aplicaciones.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

Usar equipo de protección personal (guantes, gafas).

PRESENTACION

Caja x 12

No ingerir. Evitar el contacto con ojos y mucosas.

Conservar en envase original, cerrado, en lugar fresco y seco. No exponer a temperaturas extremas.



ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR :

CORPORACION INTERNACIONAL BREMAX S.A.C.