

FICHA TECNICA

RHIZO TRON SL

NOMBRE : **RHIZO TRON SL**

TIPO DE PRODUCTO: Bioestimulante

DESCRIPCION DEL PRODUCTO :

RHIZO TRON SL, es un bioestimulante líquido innovador **formulado a base de extractos vegetales, aminoácidos, vitaminas y metabolitos naturales** que promueven un rápido desarrollo radicular.

Su acción fortalece el sistema de raíces, mejora la absorción de nutrientes y estimula la resistencia natural frente a nematodos y condiciones de estrés abiótico (sequía, salinidad, trasplante, podas).

Es la herramienta ideal para garantizar cultivos más fuertes desde el inicio y con un mejor aprovechamiento del suelo y fertilizantes.

CULTIVOS RECOMENDADOS



Hortalizas, frutales, cereales, leguminosas, ornamentales, y Tubérculos.

COMPOSICION :

Composición	%P/V
Auxinas AIB, ANA,	7000 ppm
Brasinoesteroides	1000 ppm
Aminoácidos libre	8%
Acidos organicos	7%
Vitaminas naturales (grupo B y C)	2%
pH (solución)	6-7

MODO ACCION:

RHIZO TRON SL

- ❖ Estimula la **división y elongación celular** en raíces, generando un sistema radicular más profundo y ramificado.
- ❖ Los **metabolitos vegetales** crean un entorno desfavorable para nematodos, reduciendo su impacto en raíces.
- ❖ Los **aminoácidos y ácidos orgánicos** potencian la absorción de nutrientes y mejoran la estructura del suelo.
- ❖ Aumenta la **resistencia de la planta frente al estrés hídrico, térmico y salino.**
- ❖ Favorece una **rápida recuperación post-trasplante o post-estrés.**

MOMENTO DE APLICACIÓN: Durante etapas de crecimiento vegetativo, floración, cuajado y estrés climático.

Cultivo	Dosis foliar	Dosis suelo fertirriego	MOMENTO DE APLICACION
Hortalizas (tomate, pimiento, lechuga, papa, etc.)	2 – 3 L/ha cada 10-15 días	0.5 L/200 L agua	Trasplante – Emergencia – Desarrollo inicial
Frutales (uva, cítricos, palto, mango, etc.)	3 – 4 L/ha cada 20 días	1 L/200 L agua	Brotación – Post trasplante – Etapas juveniles
Café y Cacao	2 – 3 L/ha cada 20 días	0.5 – 1 L/200 L agua	Establecimiento de plántones – Floración temprana
Cereales y Granos	1.5 – 2 L/ha		Germinación – Desarrollo radicular temprano
Pastos y Forrajes	2 – 3 L/ha cada 25 días		Post siembra – Rebrote

EFFECTOS ESPERADOS

- ❖ Corrección rápida de clorosis y deficiencias de Zn, Fe y Mn. Mayor masa radicular y mejor exploración del suelo.
- ❖ Incremento en la absorción y eficiencia de nutrientes.
- ❖ Menor incidencia de nematodos en raíces.
- ❖ Plantas más tolerantes al estrés ambiental.
- ❖ Cultivos con crecimiento uniforme y mayor rendimiento.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares.

Evitar mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

TOXICIDAD

Producto de origen natural, biodegradable y respetuoso con el ambiente.

Nivel de toxicidad: No tóxico

APLICARLO de acuerdo a las instrucciones de uso.

Medio ambiente: Producto biodegradable, de bajo riesgo ambiental, pero se recomienda evitar aplicaciones directas en fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

El líquido es soluble en agua para preparar la mezcla, agitar fuerte el envase antes de abrirlo, medir la cantidad ideal recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para

luego llevar al volumen o concentración deseada .

Se aplica empleando mochila manual, de motor, con motobomba y con avión. El equipo de aplicación debe estar en perfectas condiciones. Use boquillas de cono para las aplicaciones.

PRESENTACION

Caja x 12

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

Usar equipo de protección personal (guantes, gafas).

No ingerir. Evitar el contacto con ojos y mucosas.

Conservar en envase original, cerrado, en lugar fresco y seco. No exponer a temperaturas extremas.



ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR :

CORPORACION INTERNACIONAL BREMAX E.I.R.L.